



DLP - 4-12-87004303

# Avertissements<sup>®</sup> agricoles

Abonnement

annuel :

à l'ordre

Région de Picardie

D.D.A. du Nord

SERVICE REGIONAL DE PICARDIE (Somme et Oise)

Cité Administrative - 58, rue Jules-Barni - 80040 AMIENS - Tél. 22.92.51.27

Cité Administrative - 02016 LAON - Tél. 23.23.00.41 (Aisne)

Impression Station d'Avertissements Agricoles - B.P. 20 - 62217 BEAURAINS - Tél. 21.58.70.00

LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOANALYTIQUES

Z.A.L. - Rue Roger Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27



## spécial grandes cultures

**BULLETIN TECHNIQUE N° 6**

le 30 avril 1986

- . **Blés** : premières interventions contre le piétin verse.
- . **Orges d'hiver** : premières interventions contre les maladies du feuillage.
- . **Colza** : surveillez toujours les méligèthes.
- . **Pois** : surveillez les sitones entre la levée et le stade 10 cm.

**blé**

**Stade** : Stade 1 noeud pour les plus avancés cette semaine.

**Maladies du pied** :

**Situation - Piétin verse** :

- 1) **Oise** : précédents blés : 100 % des blés sur blés ont du piétin verse dont 80 % ont plus de 20 % de talles touchées.  
autres précédents : attaques de piétin souvent très faibles. Le seuil d'intervention est exceptionnellement atteint en blés denses de la première quinzaine d'octobre et (ou) situés en vallée.
  - 2) **Somme** : piétin présent dans 50 % des parcelles du réseau mais de façon superficielle.  
précédents blés : quelques parcelles ont 15 % de talles touchées.  
autres précédents : 5 % de talles touchées en moyenne.
  - 3) **Aisne** : précédents blés : non reuses parcelles avec 20 % de talles atteintes.  
autres précédents : attaques très faibles.
- . **Rhizoctone** : situé toujours superficiellement sur gaine.
  - . **Fusariose** : début d'attaque.

**Préconisations** : pour les blés sur blés ayant 20 % de talles touchées INTERVENEZ dès le stade 1 noeud ainsi que pour les blés denses et (ou) situés en fond de vallée ayant atteint le seuil d'intervention (20 % de talles atteintes).

**Maladies du feuillage** : toujours absentes.

P.13

**Stade :** 1<sup>er</sup> noeud pour les plus avancées.

**Maladies du feuillage :**

**Situation :**

**Oise :** situation identique au bulletin précédent.

**Somme et Aisne :** la rhynchosporiose a atteint parfois la 3<sup>ème</sup> feuille surtout sur variété Barberousse et est en évolution.

**Préconisations :** envisagez une intervention dès que la rhynchosporiose apparaît sur F 3 en tenant compte des autres maladies dans le choix du produit.

## colza

**Stade :** D1 à D2 pour jet neuf.

E pour bienvenu.



**Situation :** méligèthes : seuil rarement atteint sauf dans le Tardenois (Aisne).

**Préconisations :** la fin de sensibilité du colza aux méligèthes est le stade E. Jusqu'à ce stade, surveillez vos colzas et intervenez avec un insecticide si vous êtes en présence :

- d'un méligèthe par plante au stade D1-D2
- 2 à 3 méligèthes par plante au stade E.

**Cylindrosporiose :** observée uniquement sur jet neuf dans 80 % des parcelles en tous secteurs de l'Oise et dans quelques parcelles de la Somme.

**Préconisations :** c.f voir bulletin précédent.

## pois

**Situation :**

**Sitona :** les premières captures ont été observées dans le Sud de l'Aisne. Ces insectes causent des dégâts par les morsures provoquées sur cotylédons ou sur feuilles entre la levée et le stade 10 cm (encoche semi-circulaire sur le bord du limbe) et par la destruction des nodosités par les larves.



**Préconisations :** Surveillez vos parcelles. Intervenez en présence de nombreuses morsures (c.f schéma ci-dessous) du stade levée au stade 10 cm avec :

- Deltis : 0,5 l/ha
- Azophène ou Zolone : 1,2 l/ha
- Sumicidin : 0,5 l/ha
- spécialités à base de Lindane : 400 g m. a/ha.

denticulations



ensemble des feuilles  
très attaqué



En complément du bulletin écrit, n'oubliez pas de consulter les dernières informations d'actualités sur Minitel :  
Composez le 36.15.91.77  
et tapez ARTEL